



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
<i>Aspergillus</i> sp. průkaz Ag - galaktomannan	ELISA	srážlivá krev (sérum) na sérologické vyšetření	2 x týdně	1-3 dny pozitivní hlásíme	kvantitativní vyšetření	OV 596 200 357
<i>Candida albicans</i> průkaz protilátek	ELISA IgG, IgM, IgA	srážlivá krev (sérum) na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 8 dnů	kvantitativní vyšetření	OV 596 200 357
<i>Cryptococcus</i> sp. průkaz Ag - glucuronoxyl- mannan	LFA	srážlivá krev (sérum) nebo likvor na sérologické vyšetření	po - pá	1 den pozitivní hlásíme	kvalitativní vyšetření	OV 596 200 357
<i>Aspergillus</i> sp. (DNA) PCR	PCR	BAL, sputum, aspirát	dle potřeby (statim)	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 357 241, 265
<i>Aspergillus fumigatus</i> (DNA) PCR	PCR	BAL, sputum, aspirát	dle potřeby (statim)	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 357 241, 265
<i>Cryptococcus neoformans/gattii</i> (DNA) PCR	PCR	likvor	dle potřeby (statim)	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 357 241, 265
Mukromycety (DNA) PCR	PCR	BAL, sputum, aspirát	dle potřeby (statim)	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 357 241, 265
<i>Pneumocystis jirovecii</i> (DNA) PCR	PCR	BAL, sputum	dle potřeby (statim)	3 dny	kvantitativní hodnocení: negativní: 0 cp/ml slabě pozitivní: < 5000 cp/ml, pozitivní: 5000 cp/ml	OV 596 200 357 241, 265
Dermatofyta (DNA) PCR	PCR	Šupiny, kožní adnex, nehty	dle potřeby	2 týdny	kvalitativní hodnocení: negativní /POZITIVNÍ + určení druhu	OV 596 200 357 241, 265
<i>Aspergillus fumigatus</i> průkaz protilátek	ELISA IgG, IgM, IgA	srážlivá krev (sérum) na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 8 dnů	kvantitativní vyšetření	OV 596 200 357
<i>Aspergillus fumigatus</i> stanovení avidity IgG	ELISA IgG	srážlivá krev (sérum) na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 8 dnů	kvantitativní vyšetření	OV 596 200 357
1,3-beta-D-glukan stanovení panfungálního antigenu	kolorimetrická analýza - aktivace proteázového zymogenu	srážlivá krev (sérum) na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 8 dnů	kvantitativní vyšetření	OV 596 200 357