| NÁZEV VYŠETŘENÍ | METODA | ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK) | PROVÁDÍ SE | DOBA ODEZVY | REFERENČNÍ ROZMEZÍ | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| toxoplazmóza | ELISA IgG, IgM, IgA, IgE<br>avidita IgGimunoblot IgG, IgM, IgA | srážlivá krev<br>(sérum),<br>likvor,<br>pupečníková krev,<br>plodová voda,<br>oční tekutina,<br>kloubní punktátKFR, avidita IgG jen sérum | 1-2 x týdně | 7-10 dnů | ELISA:<br>IgG:<br>negat. < 5,4 IU/ml<br>hran. 5,4-6,6 IU/ml<br>pozit. > 6,6 IU/mlAVIDITA(%) IgG:<br>nízká IA <30<br>hraniční IA 31-35<br>vysoká IA 36-100IgM, IgA, IgE:<br>negativní IP <0,9<br>hraniční IP 0,9-1,1<br>pozitivní IP >1,1blot – kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní/hraniční | 596 200 326 |
| kongenitální, oční toxoplazmóza | komparativní immunoblot IgG, IgM | pupečníková krev/krev dítěte<br>+srážlivá krev (sérum) matkynutno souběžný odběr vzorků krve | dle potřeby | 7 dnů | Kvalitativní hodnocení na základě srovnání reakce u matky a dítěte | 596 200 326 |
| *Toxoplazma gondii* (DNA) PCR | PCR | plná krev (EDTA), plodová voda, sklivec, likvor | dle potřeby (statim) | 3 dny | kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní | OV 596 200 241<br>265 |