



Antifosfolipidový syndrom

název vyšetření	metoda	odběrový materiál (primární vzorek)	provádí se	min. doba odezvy	referenční rozmezí	kontakt
IgG protilátky proti kardiolipinu	CIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do týdne	< 20 CU	OV 596 200 232 225
IgM protilátky proti kardiolipinu	CIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do týdne	< 20 CU	OV 596 200 232 225
IgG protilátky proti β2-glykoproteinu	CIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do týdne	< 20 CU	OV 596 200 249 225
IgM protilátky proti β2-glykoproteinu	CIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do týdne	< 20 CU	OV 596 200 249 225
IgG protilátky proti β2-glykoproteinu 1 doména 1	CIA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	14 dnů	< 20 CU	OV 596 200 249 225
IgG, IgM protilátky proti anexinu V	ELISA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do týdne	< 5 IU/ml negativní 5-8 IU/ml hraniční > 8 IU/ml pozitivní	OV 596 200 249 225
IgG, IgM protilátky proti protrombinu	ELISA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do týdne	< 10 U/ml	OV 596 200 249 225
IgG, IgM protilátky proti fosfatidyl serin/ protrombin (PS/PT)	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	14 dnů	< 30 U/ml negativní > 30 U/ml pozitivní	OV 596 200 249 225
Antifosfolipidový screening IgG, IgM	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	14 dnů	< 10 U/ml negativní > 10 U/ml pozitivní	OV 596 200 249 225