



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
Autoimunitní hepatopatie IF (detekce: AMA, anti-LKM, ASMA, ANA)	IF	srážlivá krev (sérum)	2 x týdně	týden	kvalitativní hodnocení	OV 596 200 256 269
Autoimunitní hepatopatie blot 3E(BPO), AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Sp100, PML, gp210, Ro-52	Imunoblot	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do 14 dnů	kvalitativní hodnocení pro jednotlivé antigeny	OV 596 200 256 269
IBD, zánětlivá onemocnění střev (detekce: anti-pankreas, anti-pohárkové buňky (GC), ANCA, anti- <i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	IF	srážlivá krev (sérum)	2 x týdně	týden	kvalitativní hodnocení	OV 596 200 256 269
Neuro screening (a-Amphiphysin, a-CV2, a-PNMA2 (Ma2/Ta), a-Ri, a-Yo, a-Hu, a-Recoverin, a-SOX1, a-Titin, a-Zic4, a-GAD65, a-Tr (DNER))	Imunoblot	srážlivá krev (sérum)	1 x týdně	14 dnů	kvalitativní hodnocení	OV 596 200 256 269
Celiakie screen, stanovení protilátek proti t-TG ve třídě IgA a deamidovanému gliadinu ve třídě IgG	ELISA	srážlivá krev (sérum)	1 x týdně	do týdne	t-TG IgA: < 4 U/ml negativní 4 - 10 U/ml hraniční > 10 U/ml pozitivní DGP IgG: IP < 0,8 negativní IP 0,8-1,2 hraniční IP > 1,2 pozitivní	OV 596 200 232 225
Myositis screen Stanovení protilátek proti Mi2a, Mi2b, TIF1 g, MDA 5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL7, PL12, EJ, OJ, Ro-52, a-cN-1A, a-Ha, a-Ks, a-Zo	Imunoblot	srážlivá krev (sérum)	1 x týdně	do 14 dnů	kvalitativní hodnocení pro jednotlivé antigeny	OV 596 200 232 225