



| NÁZEV VYŠETŘENÍ | METODA | ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK) | PROVÁDÍ SE | DOBA ODEZVY | REFERENČNÍ ROZMEZÍ | KONTAKT |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|
| Revmatoidní faktor | NEPHEL | srážlivá krev (sérum) | po - pá | do druhého dne | do 25 IU/ml | OV 596 200 246 225 |
| Revmatoidní faktor ve třídě IgG | ELISA | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | do týdne | < 18 IU/ml negativní 18-22 IU/ml hraniční >22 IU/ml pozitivní | OV 596 200 249 225 |
| Revmatoidní faktor ve třídě IgA | ELISA | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | do týdne | < 18 IU/ml negativní 18-22 IU/ml hraniční >22 IU/ml pozitivní | OV 596 200 249 225 |
| Revmatoidní faktor ve třídě IgM | ELISA | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | do týdne | < 18 IU/ml negativní 18-22 IU/ml hraniční >22 IU/ml pozitivní | OV 596 200 249 225 |
| Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům (CCP) | ELISA | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | index positivity (IP) + hodnocení IP < 0,9 negativní IP = 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní | OV 596 200 249 225 |
| Protilátky proti citrulinovanému vimentinu (MCV) | ELISA | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | do 14 dnů | do 20 U/ml | OV 596 200 246 225 |
| Protilátky proti RA 33 | ELISA | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | do 14 dnů | do 25 U/ml | OV 596 200 246 225 |
| Antinukleární protilátky (ANA) | IF na Hep-2 buňkách | srážlivá krev (sérum) | 2 x týdně | do týdne | kvalitativní hodnocení, u pozitivních vzorků je uváděn typ positivity + titer | OV 596 200 256 269 |
| ENA/ANA screening zahrnuje SS-A, SS-B, RNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1, dsDNA, histony, ribosomální P proteiny, centromera při pozitivě se provádí typizace na tyto Ag | ELISA | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | index poz. + hodnocení | OV 596 200 232 225 |
| Typizace ENA/ANA nRNPSm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromera B, PCNA, nukleozómy, histony, ribosomální P protein, AMA M2 | Imonoblot | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | kvalitativní hodnocení s popisem | OV 596 200 232 225 |
| Typizace ENA/ANA – systémová sklerodermie Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro52 | Imonoblot | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | do týdne | kvalitativní hodnocení pro jednotlivé antigeny | OV 596 200 232 225 |
| Myositis screen Stanovení protilátek proti Mi2a, Mi2b, TIF1 g, MDA 5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL7, PL12, EJ, OJ, Ro-52, a-cN-1A, a-Ha, a-Ks, a-Zo | Imonoblot | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | do týdne | kvalitativní hodnocení pro jednotlivé antigeny | OV 596 200 232 225 |
| RNP blot | Imonoblot | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | 14 dnů | kvalitativní hodnocení pro jednotlivé antigeny | OV 596 200 232 225 |
| Mikroblot Array ANA 45 | microarray | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | 14 dnů | kvantitativní (výsledková zpráva) | OV 596 200 232 225 |
| Protilátky proti dvouvláknové DNA (ds - DNA) | ELISA | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | index positivity (IP) + hodnocení IP < 0,9 negativní IP = 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní | OV 596 200 256 269 |
| Protilátky proti nukleosomům | ELISA | srážlivá krev (sérum) | 1 x týdně | do týdne | do 20 RU/ml | OV 596 200 232 225 |
| Protilátky proti HMGCR | CIA | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | 14 dnů | < 20 CU | OV 596 200 232 225 |
| Protilátky proti DFS-70 | CIA | srážlivá krev (sérum) | dle potřeby | 14 dnů | < 20 CU | OV 596 200 232 225 |