



Autoprotilátky u systémových vaskulitid a autoimunitních onemocnění ledvin

název vyšetření	metoda	odběrový materiál (primární vzorek)	provádí se	min. doba odezvy	referenční rozmezí	kontakt
Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů	IF	srážlivá krev (sérum)	2 × týdně	do týdne	kvalitativní hodnocení	OV 596 200 256 269
Typizace protilátek proti cytoplazmě neutrofilů, ANCA	ELISA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do 14 dnů	semikvalitativní hodnocení typizace: PR3, lactoferinu, MPO, elastázy, katepsinu G, BPI	OV 596 200 256 225
Protilátky proti proteináze III (PR3)	CIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně, statim	do týdne	< 20 CU	OV 596 200 232 225
Protilátky proti myeloperoxidáze (MPO)	CIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně, statim	do týdne	< 20 CU	OV 596 200 232 225
Protilátky proti bazální membráně glomerulů (GBM)	CIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně, statim	do týdne	< 20 CU	OV 596 200 232 225
Protilátky proti C1q	ELISA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do 14 dnů	< 10 U/ml	OV 596 200 256 225
Nefrologická mozaika a-fosfolipáza A2 receptor (PLA2R) a-trombospondin typ1 (THSD7A)	IF	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do 14 dnů	kvalitativní hodnocení	OV 596 200 256 225