



## Funkční testy lymfocytů

| název vyšetření                                     | metoda          | odběrový materiál (primární vzorek) | provádí se | min. doba odezvy | referenční rozmezí      | kontakt               |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| QuantiFeron   | LTCELL<br>ELISA | speciální odběrové<br>zkumavky      | týdně      | do týdne         | dle použitých Ag        | OV 596 200 256<br>269 |
| SARS-CoV-2  | LTCELL<br>ELISA | speciální odběrové<br>zkumavky      | týdně      | do týdne         | kvantitativní hodnocení | OV 596 200 256<br>269 |
| T-SPOT TB   | ELISPOT         | heparin                             | út, st     | do druhého dne   | negativní               | 596 200 225           |
| Lyme-SPOT   | ELISPOT         | heparin                             | út, st     | do druhého dne   | negativní               | 596 200 225           |
| Spontánní blastická<br>transformace lymfocytů (BTL) | FLOW-CYT        | nesrážlivá krev<br>s heparinem      | po, út, pá | 7 dnů            | < 5%                    | OV 596 200 256<br>269 |
| BTL po stimulaci PHA                                | FLOW-CYT        | nesrážlivá krev<br>s heparinem      | út, st     | 7 dnů            | < 50%                   | OV 596 200 256<br>269 |