Tabulka č.2 – Hodnocení výsledků sp. IgE (RAST třídy)

NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
Specifické IgE (Phadiatop, Phadiatop Infant)	FEIA	srážlivá krev (sérum)	2 × týdně	týden	kvalitativní hodnocení	OV 596 200 247 225
Specifické IgE (Fx5)	FEIA	srážlivá krev (sérum)	2 × týdně	týden	kvalitativní hodnocení	596 200 247 225
Specifické IgE (Kompletní nabídka specifických IgE – viz žádanka na vyšetření alergií)	ELISA FEIA Multiplex (OPTIGEN)	srážlivá krev (sérum)	2 × týdně	do týdne	negativní do 0,35 IU/ml, semikvantitativní hodnocení ve třídách RAST. tabulka č. 2	OV 596 200 247 225
Eosinofilní kationický protein	FEIA	srážlivá krev (sérum)	1 × týdně	do týdne	kvantitativní zhodnocení < 15 ug/l negativní 15-20 ug/l hraniční > 20 ug/l pozitivní	OV 596 200 246 225
Tryptáza Při podezření na anafylaxi je významný vzestup akutní tryptázy (sAT) oproti bazální (sBT) hodnotě, pokud: sAT ≥ 1,2 × sBT + 2 µg/l	FEIA	Srážlivá krev (sérum) Plazma (EDTA, heparin)	dle potřeby	do týdne	< 11,4 ug/l	OV 596 200 247 225
THDC (Detekce celkové schopnosti degradace histaminu)	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do týdne	< 26% nízká degradace histaminu 26-40% omezená degradace histaminu > 40% dostatečná degradace histaminu	OV 596 200 246 225
ALEX	stanovení na microarray	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do týdne	kvantitativní hodnocení (výsledková zpráva)	OV 596 200 246 225
ISAC	stanovení na microarray	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby		kvantitativní hodnocení (výsledková zpráva)	OV 596 200 246 225