



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
Elektroforéza	AGSELP	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do týdne	kvalitativní hodnocení	OV 596 200 246 225
Dg. gamapatií imunofixací	IMUFIX	srážlivá krev (sérum)	po -pá	dle potřeby	kvalitativní hodnocení/ určení paraproteinu	OV 596 200 246 225
Lehké řetězce BJK	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do týdne	1,7 - 3,70 g/l K/L = 1,35-2,65	OV 596 200 246 225
Lehké řetězce BJL	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do týdne	0,9 - 2,1 g/l	OV 596 200 246 225
Volné lehké řetězce kappa	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do týdne	3,30 - 19,40 mg/l FLC K/L 0,26 - 1,65 FLC K/L renal range 0,37-3,1	OV 596 200 246 225
Volné lehké řetězce lambda	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do týdne	5,71 - 26,30 mg/l	OV 596 200 246 225