

název vyšetření	metoda	odběrový materiál (primární vzorek)	provádí se	min. doba odezvy	referenční rozmezí	kontakt
C reaktivní protein	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne, možno i statim	0 - 5 mg/l	OV 596 200 246 225
Prealbumin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	děti do 4 let 0,1 - 0,2; dospělí 0,2 - 0,4 g/l	OV 596 200 246 225
Orosomukoid	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	0,50 - 1,20 g/l	OV 596 200 246 225
Alfa-1 antitrypsin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	0,90 - 2,00 g/l	OV 596 200 246 225
Ceruloplasmin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	děti do 7 dnů 0,05 - 0,4; starší 7 dnů 0,2 - 0,6 g/l	OV 596 200 246 225
Alfa- 2 makroglobulin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	1,20 - 3,00 g/l	OV 596 200 246 225
Transferin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	děti do 7 dnů 1,3 - 3,6; starší 7 dnů 2,0 - 3,6 g/l	OV 596 200 246 225
Haptoglobin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	0,30 - 2,00 g/l	OV 596 200 246 225
Prokalcitonin	Imunochromatografický test	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	semikvantitativní hodnocení < 0,5 mg/l negativní	OV 596 200 256 269