



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
C reaktivní protein	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po - pá	do druhého dne, možno i statim	0 - 5 mg/l	OV 596 200 246 225
Alfa-1 antitrypsin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po - pá	do druhého dne	0,90 - 2,00 g/l	OV 596 200 246 225
Ceruloplasmin	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po - pá	do druhého dne	děti do 7 dnů 0,05 - 0,4; starší 7 dnů 0,2 - 0,6 g/l	OV 596 200 246 225
Prealbumin		srážlivá krev (sérum)		vyšetřuje smluvní laboratoř		OV 596 200 246 225
Orosomukoid		srážlivá krev (sérum)		vyšetřuje smluvní laboratoř		OV 596 200 246 225
Alfa- 2 makroglobulin		srážlivá krev (sérum)		vyšetřuje smluvní laboratoř		OV 596 200 246 225
Transferin		srážlivá krev (sérum)		vyšetřuje smluvní laboratoř		OV 596 200 246 225
Haptoglobin		srážlivá krev (sérum)		vyšetřuje smluvní laboratoř		OV 596 200 246 225
Prokalcitonin		srážlivá krev (sérum)		vyšetřuje smluvní laboratoř		OV 596 200 256 269