














Speciální odběrové soupravy pro IMUNOLOGICKÁ vyšetření

Basotest	Provádí se: po dohodě	
Chemiluminiscenční test		
T-SPOT TB + Lymespot	Provádí se: út, st; 4 ml krve	
Lymfocytární proliferace – BTL	Provádí se: po, út, pá	
IMK (CD3, CD4, CD8, CD19, NK, CD3/HLA-DR)		
HLA DR/monocyty		
HLA B-27 + HLA B-27 DNA* + HLA B-7		
Celiakie – rizikové HLA alely*	*Nutno přiložit informovaný souhlas pacienta!	
Laktózová intolerance*		
Polymorfismus IL28b*		

Speciální odběrové soupravy pro INFEKČNÍ vyšetření

PCR STD - (<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i> , <i>U. urealyticum</i> , <i>U. parvum</i> , <i>T. vaginalis</i>) PCR Bordetella pertussis a parapertussis	Stěr eSwab	
Kultivační vyšetření Bordetella pertussis a parapertussis (nazofaryngeální výtěr)	Transportní půda nebo eSwab, nutno domluvit telefonicky 596 200 328	
PCR stěr z kožních a slizničních lézí (herpetické viry)	Suchý dacron tampon	
Chřipky + jiné respirační viry	Virologické odběrové transportní médium	
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (genové sondy)	DNA PAP	
PCR požadavky z moče <i>Legionella pneumophila</i> – antigen <i>Streptococcus pneumoniae</i> – antigen <i>Streptococcus agalactiae</i> – antigen	Močová zkumavka bez kyseliny borité	
Clostridium difficile – toxiny A a B	Ne výtěr! Odběrová zkumavka s lopatkou	
TBC	Polypropylenová neprůhledná odběrová souprava	
QuantIFERON TB Plus (Nil+TB1+TB2+Mitg)	Speciální odběrové soupravy, telefonické objednání 596 200 225	
Akantamébová keratitida	Telefonické objednání (596 200 326)	Speciální půda