

Výtěr z nosohltanu deponovaný do virologického média pro průkaz viru SARS-CoV-2 metodou PCR

Výtěr se provádí suchým sterilním tamponem z nylonu (dakronu) na flexibilní plastové tyčince vhodným pro nasopharyngeální výtěr (ideálně FLOQSwabs). Nelze použít tampón vyrobený z vaty či bavlny. Pacienta necháme před odběrem odkašlat.



Pro jednoho pacienta je 1 zkumavka a 2 odběrové tampony:

- 1. tampon – výtěr zadní stěny nosohltanu
- 2. tampon – výtěr patrových oblouků

Postup:

Jedním tamponem se provádí výtěr zadní stěny nosohltanu přes nosní díрку. Výtěr provedeme energicky při současné rotaci tamponem tak, aby se zachytilo co nejvíce zejména buněčného materiálu. Tampon s materiálem vložíme a zalomíme do zkumavky s virologickým odběrovým médiem rozmraženým těsně před odběrem (možno rozmrazit pod tekoucí teplou vodou nebo nechat rozpustit při pokojové teplotě).

U téhož pacienta provedeme druhým tamponem i výtěr patrových oblouků (tonzilám se při odběru na virologii vyhneme) a vložíme do stejné zkumavky. Zkumavku s tampony pečlivě uzavřeme zátkou.

Do doby transportu uchováváme v chladničce při 4-10°C. Transportovat v trojbalu chlazené.

Největší výtěžnost má odběr v akutní fázi infekce.

Trojbalu na požádání rozesílá Centrální příjem biologického materiálu: tel.: 596 200 461.

Zkumavky s virologickým médiem, tampony a žádanky rozesílá virologické odd.: tel.: 596 200 316, 312.

Oddělení virologie Ostrava: 596 200 316 (PhDr. Ivana Vidličková)